

Esfera[®] 300 SC

Tebuconazole 200g/l – Trifloxystrobin 100 g/l



Formulación	: Suspensión concentrada (SC)
Modo de Acción	: Fungicida preventivo curativo con actividad mesostémica y sistémica sobre el cultivo.
Mecanismo de Acción	: Inhibe la biosíntesis de ergosterol, procesos enzimáticos y la respiración celular de los hongos.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Triazoles. Estrobirulina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fungicida preventivo y curativo con actividad mesostémica y sistémica sobre el cultivo. Posee dos ingredientes activos en su formulación que actúan de manera complementaria. Tebuconazole inhibe la biosíntesis de ergosterol y otros procesos enzimáticos de los hongos, mientras que Trifloxystrobin inhibe la respiración celular de los hongos.

Indicaciones de Uso

Aplicar a los primeros síntomas de la enfermedad. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previa mezcla en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión. Se recomienda 3 aplicaciones por campaña dentro de un programa de manejo integrado. Realizar aplicaciones preventivas.

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

Primeros Auxilios

En casos de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso. De soporte respiratorio si es necesario. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente. En caso de intoxicación o contaminación ocular o dermal, lavar con abundante agua y llevar al paciente al médico.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico, por lo que debe seguirse un tratamiento sintomático.

06/11/2019



Esfera® 300 SC

Tebuconazole 200g/l – Trifloxystrobin 100 g/l



Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ ha	%		
Arroz	Mancha foliar	<i>Pyricularia Oryzae</i>	400-450	0.125-0.15	35	2,0 (1) 0,02 (2)

* PC=Periodo de carencia (días)

** LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

(1) Tebuconazole (2) Trifloxystrobin

Envases : Envase x 1 litro

Número de Registro : PQUA N° 417 - SENASA

06/11/2019

