

Trivia® 727 PM

Propineb 667 g/kg – Fluopicolide 60 g/kg

Formulación	: Polvo Mojable WP
Modo de Acción	: Fungicida curativo
Mecanismo de Acción	: Fluopicolide tiene actividad antiesporulante y buen potencial curativo. Propamocarb actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Ditiocarbamatos (Propineb) – Benzamide pyridine (Fluopicolide)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Trivia 727 PM es un fungicida formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopicolide y Propineb. Fluopicolide actúa en proteínas específicas esenciales en las interacciones entre la membrana y el citoesqueleto mientras que propineb posee un efecto multisitio.

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Preparar la mezcla según la dosis en etiqueta en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

En zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña al año, considerando una sola campaña al año.

Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión no inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Lleve al médico. En caso de contaminación por piel, quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico. En caso de contaminación en ojos, lave el ojo afectado con agua limpia por mínimo 15 minutos, cubra el ojo y acuda al médico. En caso de intoxicación por inhalación, retire a la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto: Tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.



Trivia® 727 PM

Propineb 667 g/kg – Fluopicolide 60 g/kg

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			LMR** (ppm)	PC* (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	%	g/cil	Kg/ha		
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.2-0.3	400-600	1-1.5	0.1(1) 0.02 (2)	14
Vid	Plasmopara	<i>Plasmopara viticola</i>	0.25	--	--	5 (1) 2 (2)	30
Quinoa	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>	--	--	1.5-2.0	0.05(1) 0.01 (2)	n.d.

*PC = Periodo de carencia (días)

**LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

n.d. = No determinado

(1) LMR: Propineb

(2) LMR: Fluopicolide

Envases : Caja x 500 g
Caja x 1 kg

Numero de Registro : PQUA N° 357-SENASA

