

# Zantara® 216 EC

Bixafen 50 g/L – Tebuconazole 166 g/L



<b>Formulación</b>	: Concentrado Emulsionable.
<b>Modo de Acción</b>	: Fungicida sistémico con propiedades curativas.
<b>Mecanismo de Acción</b>	: Bixafen actúa bloqueando una enzima que tiene un papel importante en la cadena respiratoria del patógeno, lo cual reduce la producción de energía de manera que el crecimiento del patógeno se inhibe. Por otro lado Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol y otros procesos enzimáticos de los hongos.
<b>Toxicidad</b>	: Ligeramente Peligroso.
<b>Grupo Químico</b>	: Pyrazole (Bixafen) + Triazole (Tebuconazole).

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Zantara 216 EC es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios Bixafen y Tebuconazole.

### Indicaciones de Uso

Se recomienda aplicar Zantara 216 EC (i.a Bixafen +Tebuconazole) hasta dos veces por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 15 días.

El momento de aplicación debe ser previa evaluación de la presencia de la enfermedad.

Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

### Primeros auxilios

Grupo químico: Pyrazole + Triazole

En caso de intoxicación, brindar asistencia médica, de ser necesario trasladar al paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión trasladar inmediatamente al paciente a un centro médico. No administrar nada por vía oral si la persona está inconciente.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los tuviera.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón. Quitar la ropa contaminada.

En caso de inhalación, trasladar al paciente al aire libre de ser necesario aplicar respiración artificial. Trasladar al paciente a un centro médico.

**Indicaciones para el médico:** Tratamiento sintomático y de soporte.

**Antídoto:** Tratamiento sintomático. No se ha determinado un antídoto específico.



# Zantara® 216 EC

Bixafen 50 g/L – Tebuconazole 166 g/L



## Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS	PC*	LMR**
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	(días)	(ppm)
Arroz	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.75	N.d.	Tebuconazole: 1.5; Bixafen: 0.01

\*PC = Periodo de carencia (días)

\*\*LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

N.d.= No determinado

**Envases** : Frasco x 1 L

**Número de Registro** : Reg. PQUA N° 1706-SENASA

